

رابطه بین سطح آلانین آمینوتранسفراز سرمی و یافته‌های آسیب‌شناسی کبدی در مبتلایان به هپاتیت C مزمن

دکتر ناصر ابراهیمی دریانی^۱، دکتر فرید آزموده اردلان^۲، دکتر ترانه در محمدی^۳، دکتر محمد بشاشتی^۴

دکتر علی اسد هشت رو دی^۵، دکتر بابک حق پناه^۶، دکتر علیرضا سیاح^۷، دکتر مجید شکیبا^۸

^۱ استاد، بخش گوارش، بیمارستان امام خمینی، دانشگاه علوم پزشکی تهران

^۲ استادیار، بخش پاتولوژی، بیمارستان امام خمینی، دانشگاه علوم پزشکی تهران

^۳ پژوهشگر، بیمارستان امام خمینی، دانشگاه علوم پزشکی تهران

^۴ پژوهشگر، مرکز تحقیقات گوارش، بیمارستان امام خمینی، دانشگاه علوم پزشکی تهران

چکیده

زمینه و هدف

در اغلب بیماریهای کبدی، افزایش سطح آلانین آمینوترانسفراز (ALT★) می‌تواند نشانه‌ای از نکروز سلولی باشد؛ ولی هنوز مطالعه‌ای در این زمینه در ایران انجام نشده است.

روش بررسی

این مطالعه جهت مقایسه درجه (grade)، مرحله (stage) و مقیاس فعالیت بافتی (HAI Score) در دو گروه از مبتلایان به هپاتیت مزمن C با آلانین آمینوترانسفراز سرمی طبیعی و افزایش یافته طراحی شده است. در این مطالعه ۳۲ بیمار با آلانین آمینوترانسفراز سرمی طبیعی و ۸۴ بیمار با آلانین آمینوترانسفراز سرمی افزایش یافته مورد بررسی قرار گرفته‌اند.

یافته‌ها

میانه درجه و مرحله در گروه با سطح طبیعی آنزیم به ترتیب ۴ و ۱ و در گروه با سطح افزایش یافته آنزیم به ترتیب ۵/۶ و ۲ به دست آمد. مرحله بزرگتر از ۲ به ترتیب در ۵ بیمار (۱۵/۶٪) با سطح طبیعی آنزیم و ۳۶ بیمار (۴۲/۹٪) با سطح افزایش یافته آنزیم مشاهده شد ($p=0.006$).

نتیجه‌گیری

اگرچه ضایعات کبدی در بین مبتلایان به هپاتیت مزمن C با سطح طبیعی آلانین آمینوترانسفراز سرمی خفیف‌ترند، لیکن نمونه‌برداری و بررسی آسیب‌شناسی کبدی به عنوان یک روش تشخیصی مفید در تمامی مبتلایان به هپاتیت مزمن C، صرف نظر از سطح سرمی آلانین آمینوترانسفراز توصیه می‌گردد.

کلید واژه: هپاتیت C، سطح آنزیم طبیعی، آسیب‌شناسی کبد

گوارش/دوره ۹، شماره ۴، زمستان ۱۳۸۳، ۲۲۶-۲۳۶

در اکثر بیماریهای کبدی از جمله هپاتیت C، از سطح آلانین آمینوترانسفراز کبدی جهت برآورده میزان آسیب کبدی و همچنین شدت بیماری استفاده می‌شود.^(۱ و ۳) حدود ۲۰ درصد بیماران مبتلا به عفونت مزمن هپاتیت C دارای سطح ALT طبیعی می‌باشند. همچنان به علت نوسانهای سطح ALT تشخیص بیماران با سطح طبیعی پایدار (persistently normal) مشکل است، و بستگی به تعداد دفعات ثبت ALT و مدت پیگیری بیماران دارد.^(۱ و ۴) عواملی مانند سن بیماران، جنسیت و شاخص توده بدنی (BMI★*) به صورت مستقل بر

زمینه و هدف

عفونت با ویروس هپاتیت C از مهمترین علل ابتلا به بیماریهای مزمن کبدی در سطح جهان است. از میان مبتلایان به نوع مزمن این بیماری، ۵ تا ۲۵ درصد در طول مدت ۲۰-۲۵ سال به سیروز مبتلا می‌شوند.^(۱) بر اساس آمار منتشر شده میزان شیوع عفونت با این ویروس در ایران کمتر از یک درصد است. اما با توجه به وجود معنادان تزریقی به نظر می‌رسد این آمار روبه افزایش باشد.^(۲)

نویسنده مسئول: تهران، بلوار کشاورز، بیمارستان امام خمینی، بخش گوارش، تلفن: ۸۸۷۹۹۴۴۶ - نمبر: ۸۸۷۹۹۸۴۰

E-mail: nebrahim@sina.tums.ac.ir

* Alanine Aminotransferase

** Body Mass Index

یافته‌ها

دو گروه بیماران بررسی شده از نظر مشخصات دموگرافیک و عوامل خطرساز ابتلا به هپاتیت C همسان بودند (جدول ۱).


جدول ۱: مشخصات بیماران بررسی شده در دو گروه

مشخصات بیماران	گروه با ALT بالا	گروه با ALT طبیعی	گروه با ALT سرمهی
سن (سال)	۳۱ (۱۰-۴۵)	۴۰ (۲۰-۶۴)	۸۱ (۴۶-۹۵/۸)
جنسیت (مرد)	۲۵ (٪ ۷۸/۱)	۲۳ (٪ ۷۲-۷۷)	۴۲ (٪ ۱۸-۶۷)
BMI	۲۳ (٪ ۱۷-۲۷)	۲۳ (٪ ۷۲/۱)	۲۲ (٪ ۱۶-۳۱)
استعمال سیگار	۴۴ (٪ ۷۲/۱)	۴۰ (٪ ۷۲/۷)	۴۰ (٪ ٪ ۷۲/۷)
عوامل خطرساز			
صرف مواد مخدر تزریقی	۲۴ (٪ ۶۸/۸)	۲۴ (٪ ۷۴/۱)	۶۰ (٪ ٪ ۷۴/۱)
سابقه تزریق خون	۷۱ (٪ ٪ ۷۴/۷)	۱۱ (٪ ٪ ۵۷/۹)	
سابقه جراحی	۳ (٪ ٪ ۹/۴)	۴ (٪ ٪ ۴/۸)	
سابقه خالکوبی	۵ (٪ ٪ ۱۵/۶)	۹ (٪ ٪ ۱۰/۷)	
سابقه اعمال دندانپزشکی	۴ (٪ ٪ ۱۲/۵)	۸ (٪ ٪ ۹/۵)	
سابقه زندانی بودن	۸ (٪ ٪ ۲۵)	۱۱ (٪ ٪ ۱۳/۱)	

در مقایسه بین دو گروه p value در مورد تمام عوامل بیش از 0.05 بوده است. مقادیر به صورت میانه (دامنه) و یا تعداد (درصد) می‌باشد.

مقدار p value جز برای سطح ALT غیرمعنی دار بود.

میانه درجه و مرحله در گروه با سطح طبیعی آنزیم به ترتیب 4 و 0 در گروه با سطح افزایش یافته آنزیم به ترتیب $26/5$ و 2 به دست آمد. مرحله و درجه بالاتر در گروه با سطح آنزیمی غیر طبیعی به طور معنی داری بیشتر بود (به ترتیب $p=0.02$, $p=0.002$) (شکل‌های ۱ و ۲).



شکل ۱: توزیع مرحله درگیری (stage) در بیماران بررسی شده

* Polymerase Chain Reaction

** ribonucleic acid

*** Human Immunodeficiency Virus antibody

**** Hepatitis B surface Antigen

***** Hepatitis B core antibody

***** IgM Hepatitis A Virus Antibody

سطح ALT سرمهی در مبتلایان به هپاتیت مزمن C تأثیرگذارند.^(۱) بر اساس بررسیهای به عمل آمده، مطالعه‌ای درباره رابطه سطح ALT و میزان آسیب کبدی از ایران منتشر نشده است. این مقاله نتیجه مقایسه درجه، مرحله و مقیاس فعالیت بافتی در دو گروه از مبتلایان به هپاتیت مزمن C با آلانین آمینوترانسферاز سرمهی طبیعی و افزایش یافته در بیمارستان امام خمینی، وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تهران، در فاصله سالهای ۱۳۸۱-۸۲ است.

روش بررسی

در این مطالعه که از نوع بررسی موارد (case series) می‌باشد،^(۱) بیمار anti-HCV مثبت (ELISA; Orthodiagnosis System) که توسط Roche diagnostics, New Jersey, USA PCR★ (Amplicor) از نظر RNA★ ویروس نیز مثبت بودند مورد بررسی قرار گرفتند. هیچ یک از بیماران، سابقه درمان ضد ویروسی، مصرف الکل، تالاسمی مژور، سیروز بالینی و سایر بیماریهای شناخته شده کبدی ذکر نمی‌کردند.

در بررسیهای اولیه هیچ یک از بیماران از نظر anti-HIV★★★، IgM anti HAV*****، anti HBsAg****، anti HBc*****،

مثبت نبودند و منعی برای انجام نمونه‌برداری کبدی نداشتند.

۳۲ بیمار حداقل دوبار ALT سرمهی ثبت شده کمتری مساوی ۴۰ IU/L در شش ماه اخیر قبل از شروع مطالعه داشته‌اند (گروه با سطح آنزیم طبیعی).^(۲) بیمار حداقل یک سطح آنزیمی ثبت شده بالاتر از ۴۰ IU/L در یک ماه اخیر قبل از نمونه‌برداری و حداقل یک آنزیم بالا در شش ماه اخیر قبل از نمونه‌برداری داشتند (گروه با سطح آنزیم بالا). بیمارانی که فقط یک ALT غیرطبیعی داشتند وارد مطالعه نشدند (۶ بیمار).

پرتوکل مطالعه توسط کمیته اخلاق در پژوهش دانشگاه تأیید گردید. از کلیه بیماران بررسی شده نیز راضیت‌نامه کتبی دریافت شد. نمونه‌برداری کبدی از طریق پوست در تمامی بیماران به عمل آمد. حداقل اندازه قابل پذیرش نمونه‌برداری کبدی برابر با طول $۱/۰$ سانتی‌متر و عرض $۰/۱$ سانتی‌متر بود. هر نمونه باید حداقل ۴ فضای پورت را در بر می‌گرفت. نمونه‌ها در فرمالین تثبیت شدند و توسط یک آسیب‌شناس که از سطح آنزیم کبدی بیماران بی اطلاع بود مورد بررسی قرار گرفتند. از سیستم HAI تعديل شده (Modified Histological Activity Index) جهت تعیین شدت آسیب کبدی استفاده گردید. براساس این سیستم درجه درگیری از صفر تا ۱۸ و مرحله درگیری از ۶ تا ۱۲ رتبه‌بندی شد.^(۵) اطلاعات جمع‌آوری شده توسط نرم افزار SPSS تحت تجزیه و تحلیل قرار گرفت. از آزمون t مستقل، کای-دو، و مان‌ویتنی جهت تحلیل آماری داده‌ها استفاده شد.

مبلا به عفونت هپاتیت C اختلاف نظر وجود دارد. بعضی محققان نتایج بافت‌شناسی کبد را در افراد دارای سطوح طبیعی ALT، طبیعی گزارش کرده‌اند^(۷)، در حالی که گروهی بیان کرده‌اند که ویرمی در افراد با سطح ALT طبیعی با آسیب کبدی همراه است^(۸-۱۰)، و برخی نشان داده‌اند که هیچ تفاوتی بین نمونه‌های بافت‌شناسی کبد در افراد دارای ALT طبیعی و ALT بالا وجود ندارد.^(۱۱)

بنابراین سطح ALT دائمًا طبیعی، آسیب کبدی را در این بیماران رد نمی‌کند و جهت شروع درمان اغلب باید براساس میزان فیبروز موجود در نمونه بافت‌شناسی کبد تصمیم‌گیری کرد.


مطلوب دیگر این است که آیا بیماران با ALT دائمًا طبیعی باید تحت نمونه‌برداری کبد قرار گیرند یا نه؟ این مسئله دقیقاً با اندیکاسیون درمان در این بیماران مرتبط می‌شود.^(۱۲، ۱۳)، برخی محققان معتقدند که نمونه‌برداری کبد باید در تمام بیماران با ALT طبیعی انجام شود.^(۱۴-۱۶)، در مقابل مطالعات دیگر بیان می‌کنند که این بیماران باید تحت نظر باشند و پیگیری شوند ولی درمان نشوند، چرا که پیشرفت آسیب کبدی در این بیماران با گذشت زمان افزایش پیدا نمی‌کند^(۱۷) و پیشرفت به سیروز انداک است و یارخ نمی‌دهد.^(۱۸)

در این مطالعه برای تشخیص افراد با ALT طبیعی، بیمارانی را وارد طرح کردیم که دست کم دو نمونه ALT طبیعی (سطح کمتریا مساوی ۱/۵ برابر طبیعی) طی مدت حداقل ۶ ماه داشته‌اند ($ALT \geq 40 \text{ IU/L}$) و افرادی که سطح ALT در آنها نوسان عمده داشت از مطالعه ما خارج شدند. این در حالی است که مطالعات قدیمی تر فقط یک سطح طبیعی ALT را ملاک قرار داده بودند که قادر به رد کردن بیماری کبدی و حتی سیروز نمی‌باشد.^(۱۹-۲۳)

ما با ارزیابی سطح ALT ≤ ۲ باریه فاصله حداقل ۶ ماه، سعی کردیم موارد نوسان دار با افزایش قابل توجه ALT را شناسایی کنیم. البته این احتمال هست که توانسته باشیم تمام موارد نوسان دار ALT را رد کرده باشیم. شاید ما با افزایش تواتر ارزیابی ALT، مشابه آنچه که پاسکوال^{*} باشیم. ارزیابی کرد بودند)^(۲۴)، می‌توانستیم براین مسئله فائق آییم.

با توجه به تأثیر الكل، عفونت همزمان HIV و یا HBV در آسیب کبدی افراد مبتلا به عفونت هپاتیت C^(۲۵) (جهت جلوگیری از موارد مثبت کاذب در بررسی بافت‌شناسی کبد، این افراد نیاز از طرح مخارج شدند. البته قابل ذکر است که به علت بافت فرهنگی موجود در جامعه ما کلأً تعداد افراد الكلی (heavy drinker) بسیار انداک بود.

مشکل دیگر موجود در بررسی ما این بود که ما قادر به تعیین زمان دقیق آنودگی به عفونت هپاتیت C (به جز مواردی که ناشی از انتقال خون بودند) نبودیم و در نتیجه بررسی سیروز بیماری از زمان شروع و



شکل ۲: توزیع درجه درگیری (grade) در دو گروه بررسی شده

مرحله بزرگتر از ۲ به ترتیب در ۵ بیمار (۱۵/۶٪) با سطح طبیعی آنزیم و ۳۶ بیمار (۴۲/۹٪) با سطح افزایش یافته آنزیم مشاهده گردید.^(۶)

از میان بیماران با سطح آنزیمی بالا ۵ بیمار (درصد) مبتلا به سیروز پاتولوژیک (مرحله ۶) و ۱۲ بیمار (۱۴/۳ درصد) مبتلا به فیبروز پل زنده (bridging fibrosis) بودند. این ارقام در افراد با سطح طبیعی آنزیم مساوی با یک نفر در هر یک از گروههای فوق بود.

بحث

عفونت هپاتیت C مزمن یکی از علل شایع بروز بیماری کبدی و سیروز است؛ و در بسیاری از کشورها علته شایع جهت انجام پیوند کبد محسوب می‌شود. علاوه بر این بسیاری از افراد مبتلا به عفونت هپاتیت C مزمن آسیب کبدی خفیف دارند و حتی هیچ‌گاه به سمت فیبروز پیشرفت نمی‌کنند و عده بسیاری از این افراد سطح آلانین آمینوترانسفراز (ALT) طبیعی دارند.^(۱، ۳، ۴)

لذا برای تصمیم‌گیری شروع درمان در عفونت هپاتیت C مزمن، به معیاری حساس و دقیق جهت ارزیابی آسیب کبدی نیاز داریم که آسان، در دسترس و ارزان قیمت نیز باشد.

بر اساس پیشنهاد انجمن کبد آمریکا لازم است درمان صرف نظر از سطح ALT، بر اساس مشخصات هر بیمار (شدت فیبروز کبدی در نمونه‌برداری کبدی، احتمال پاسخ به درمان و عوارض درمان در هر فرد) پایه‌ریزی گردد.^(۳)

هر چند ALT یکی از رایجترین آزمونهایی است که به منظور بررسی میزان آسیب کبدی به کار می‌رود، ولی نکته اساسی این است که ALT معیاری کافی برای ارزیابی میزان آسیب کبدی در بیماران مبتلا به هپاتیت C نیست؛ چرا که حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد بیماران مبتلا به هپاتیت C مزمن دائمًا سطح ALT طبیعی دارند و در ۵ درصد از آنها به طور متناوب به سطح طبیعی افت می‌کند.^(۶)

در مورد ارتباط بین سطح ALT و یافته‌های بافت‌شناسی در بیماران

* Pasqual

مطالعه ۱۵ بیمار (۱۶ درصد) دارای ALT طبیعی التهاب و یا فیبروز قابل توجهی داشتند.^(۳۳)

علی‌رغم یافته‌های بعضی محققان مبنی بر فقدان آسیب کبدی جدی نیازمند درمان در افراد با ALT دائمًا طبیعی که آنها را از نمونه‌برداری کبد بی‌نیاز می‌کند^(۱۱ و ۱۷ و ۱۸) و همگام با گروه دیگری از دانشمندان^(۳۳)، ما دریافتیم که درصد قابل ملاحظه‌ای از افراد مبتلا به عفونت هپاتیت C مزمن (۲۷/۶ درصد) سطح ALT طبیعی دارند و ۱۵/۶ درصد از این افراد آسیب قابل توجه (مرحله ۲)^(۲) در بررسی بافت‌شناسی کبد دارند که بدون انجام نمونه‌برداری کبد شناسایی این افراد صرفاً براساس سطح ALT امکان پذیر نیست.

نتیجه‌گیری

نمونه‌برداری کبد باید به عنوان استاندارد طلایی جهت شناسایی آسیب کبدی (مرحله) به کار برد شود. با این روش نه تنها به بیمارانی که آسیب کبدی اندکی دارند اطمینان می‌بخشیم، بلکه بیماران با آسیب کبدی جدی تر، که ممکن است از درمان سود ببرند^(۳۴ و ۳۵) را نیز شناسایی می‌کنیم و بدین وسیله جلوی پیشرفت بیماری و بروز عوارضی نظری‌سیروز و سرطان سلول کبدی رانیزمی گیریم. بنابراین تصمیم‌گیری درمان نباید براساس سطح ALT باشد؛ چرا که ALT به هیچ وجه قادر به پیشگویی مرحله (فیبرоз)، پاسخ به درمان و یا عوارض بیماری کبدی پیشرفت نیست.

* Toyoda

** Nutt

*** Kyrlagkitsis

پیشرفت به سمت سیروز میسر نبود، چرا که ۲۰ درصد این افراد طی مدت ۱۰ تا ۲۰ سال به سمت سیروز پیشرفت می‌کنند.^(۲۷)

تویودا^{*} و همکارانش بیان کردند که سن و جنس به طور مستقل، سطح ALT سرمی را تحت تأثیر قرار می‌دهند^(۲۸)، ولی در مطالعه ما، مشابه سایر مطالعات عوامل دموگرافیک نظیر سن، جنس، BMI و عوامل خطرساز جهت انتقال عفونت HCV در بین دو گروه ALT طبیعی و ALT بالا مشابه بود.^(۳۰ و ۲۹)

مشابه نات^{**} و همکارانش، مادری‌افتیم که التهاب (درجه) و فیبروز (مرحله) از لحاظ آماری در بیمارانی که ALT طبیعی دارند کمتر از افراد با ALT بالا می‌باشد ولی با این حال شدت صدمه کبدی در تعدادی از این افراد قابل توجه بود.^(۳۰)

در خصوص مراحل پیشرفت بیماری، یافته‌های ما با مطالعات پاسکوال متفاوت بود که هیچ موردی از سیروز و فیبروز پل زننده شدید در گروه ALT طبیعی گزارش نشده بود و در مورد گروه ALT بالا ۲ نفر (۳/۶ درصد) سیروز و یک نفر (۱/۳ درصد) هپاتیت مزمن شدید داشت.^(۲۴)

مطالعات مختلفی در افراد با سطح آنژیمی طبیعی، پیشرفت آهسته و یا حتی عدم پیشرفت فیبروز کبدی را گزارش کرده‌اند. به همین علت این محققان جهت ارزیابی بیماران دارای ALT طبیعی، نمونه‌برداری کبد را توصیه نمی‌کنند.^(۱۷ و ۲۵ و ۳۱ و ۳۲)

کرلاکیتسیس^{***} و همکارانش طی بررسی ۹۱ بیمار مبتلا به عفونت هپاتیت C مزمن و ALT طبیعی و مقایسه آن با افراد ALT بالا، بیان کردند که افراد ALT طبیعی فیبروز و التهاب کمتری نسبت به افراد بالا داشتند، ولی از طرفی هیچ کدام بافت‌شناسی طبیعی نداشتند. در این

References

- Pradat P, Alberti A, Poynard T et al. Predictive value of ALT levels for histologic findings in chronic hepatitis C: a European collaborative study. *Hepatology* 2002; 36: 973-7.
- Management of hepatitis C infection Regional Guideline. Hepatitis Mnonthly: Iran Hepatitis group Newsletter 2004; 4: 2.
- Strader DB, Wright T, Thomas DL et al. Diagnosis, management, and treatment of hepatitis C. *Hepatology* 2004; 39: 1147-71.
- Prati D, Taioli E, Zanella A et al. Updated definitions of healthy ranges for serum alanine aminotransferase levels. *Ann Intern Med* 2002; 137: 1-10.
- Ishak K, Baptista A, Bianchi L et al. Histologic grading and staging of chronic hepatitis. *J Hepatol* 1995; 22: 696-9.
- Reddy KR. Debate: Hepatitis C with normal liver enzymes: To treat or not to treat. *Am J gastroenterol* 2004; 973-4.
- National Institutes of Health Consensus Development Conference Statement: management of hepatitis C: 2002. *Hepatology* 2002; 36(suppl 1): S3-S20.
- Stanley AJ, Haydon GH, Piris J et al. Assessment of liver histology in patients with normal transaminase levels. *Eur J Gastroenterol Hepatol* 1996; 8:869-72.
- Alberti A, Morsica G, Chemello L et al. Hepatitis viraemia and liver disease in symptom-free individuals with anti-HCV. *Lancet* 1992; 340: 397-8.
- Bacon BR. Treatment of patients with Hepatitis C and Normal Serum Aminotransferase levels. *Hepatology* 2002; 36: S179-S184.
- Puoti C, Magrini A, Stati T et al. Clinical, histological features of hepatitis C virus carriers with persistently normal or abnormal alanine transaminase levels. *Hepatology* 1997; 26: 1393-8.
- EASL International Consensus Conference on Hepatitis C,

- Paris, 26-28 February 1999, *J Hepatol* 1999; 30: 956-61.
13. Management of hepatitis C - NIH Consensus Development Conference. *Hepatology* 1997; 26(Suppl 1): 1S-155S.
 14. Seymour C. Asymptomatic infection with hepatitis C virus. *Br Med J* 1994; 308: 670-1.
 15. Booth JCL, Brown JL, Thomas HC. The management of chronic hepatitis C virus infection. *Gut* 1995; 37: 446-54.
 16. Healey CJ, Champan RWG, Fleming KA. Liver histology in hepatitis C infection: a comparison between patients with persistently normal or abnormal transaminases. *Gut* 1993; 37: 274-8.
 17. Martinot-Peignoux M, Boyer N, Cazals - Hatem D *et al.* Prospective study on anti-hepatitis C virus - positive patients with persistently normal serum alanine transferase with or without detectable serum hepatitis C virus RNA. *Hepatology* 2001; 34: 1000-65.
 18. Suozzo R, Conte S, De Seta M *et al.* Natural history of hepatitis C virus carriers with persistently normal aminotransferase levels. *Gastroenterology* 2000; 118: 760-4.
 19. Di Bisceglie AM, Goodman ZD, Ishak KG *et al.* Long - term clinical and histopathological follow-up of chronic posttransfusion hepatitis. *Hepatology* 1991; 14: 969-74.
 20. Esteban JI, Lopez - Talavera JC, Genesca J *et al.* High are of infectivity and liver disease in blood donors with antibodies to hepatitis C virus. *Ann Intern Med* 1991; 115: 443-9.
 21. Alberti A, Morsica G, Chemello L *et al.* Hepatitis C viraemia, and liver disease in symptom - free individuals with anti-HCV. *Lancet* 1992; 340: 697-8.
 22. Van Thiel DH, Caraceni P, Molloy PJ *et al.* Chronic hepatitis C in patients with normal or near normal alanine aminotransferase levels. The role of interferon α2b therapy. *J Hepatol* 1995; 23: 503-8.
 23. Gholson CF, Morgan K, Catinis G *et al.* Chronic hepatitis C with normal aminotransferase levels. A clinical histologic study. *Am J Gastroenterol* 1996; 92: 1788-92.
 24. Pasquale G, Sagnelli E, Coppola N *et al.* Is liver biopsy necessary for hepatitis C virus carriers with persistently normal aminotransferase levels? *Eur J Gastroenterol Hepatol* 2003; 15: 831-3.
 25. Mathurin P, Moussalli J, Cadranel JF *et al.* Slow progression rate of fibrosis in hepatitis C virus patients with persistently normal alanine aminotransferase activity. *Hepatology* 1998; 27: 868-72.
 26. Safdar K, Schiff ER. Alcohol and hepatitis C. *Semin Liver Dis* 2004; 24: 305-15.
 27. Ienstag JL, Isselbacher KJ. Chronic viral hepatitis. In: Braunwald, Fauci, Kasper *et al.*, editors. Harrison's principles of internal medicine. 16th ed. New York: McGraw Hill; 2005. p. 1844-55.
 28. Toyoda M, Kumada T, Kiriyama S *et al.* Influence of age Sex, and degree of live fibrosis on the association between serum with chronic hepatitis c. *Digestive Disease and Sciences* 2004; 49: 265-99.
 29. Puoti C, Castellacci R, Montagnese F *et al.* Histological and virological features and follow-up of hepatitis C virus carriers with normal aminotransferase levels: the Italian prospective study of the asymptomatic C carriers (ISACC). *J Hepatol* 2002; 37: 117- 23.
 30. Nutt AK, Hassan HA, Lindsey J *et al.* Liver biopsy in the evaluation of patients with chronic hepatitis C who have repeatedly normal or near-normal serum alanine aminotransferase levels. *Am J Med* 2000; 109: 62-4.
 31. Castellacci R, Montagnese F, Zaltron S *et al.* Histological and virological features and follow-up of hepatitis C study of the asymptomatic C carriers. *J Hepatol* 2002; 37: 117- 123.
 32. Persico M, Persico E, Suozzo R *et al.* Natural history of hepatitis C virus carriers with persistently normal aminotransferase level. *Gastroenterology* 2000; 118: 760-4.
 33. Kyrlagkitsis I, Portmann B, Smith H *et al.* Liver histology and progression of fibrosis in individuals with chronic hepatitis C and persistently normal ALT. *Am J Gastroenterol* 2003; 98: 1588.
 34. Brillanti S, Levantesi F, Nigro G *et al.* Peginterferon - based therapy for chronic hepatitis C virus infection in patients with normal alanin aminotransferase levels. *Ann Internal Med* 2003; 13: W 83.
 35. Zeusem S, Diago M, Gane E *et al.* International, multicenter, randomized, controlled study for treatment of patients with chronic hepatitis C and persistently normal ALT levels with peginterferon alfa-2a (40KD) (PEGASYS) and ribavirin (COPEGASYS). *Hepatology* 2003; 38(suppl 1): 208A.

Ebrahimi Daryani N

Department of
Gastroenterology, Imam
Khomeini Hospital, Tehran
University of Medical Sciences

Azmudeh Ardalan F

Department of Pathology,
Imam Khomeini Hospital,
Tehran University of Medical
Sciences

Dormohammadi T

Imam Khomeini Hospital,
Tehran University of Medical
Sciences

Bashashati M

Imam Khomeini Hospital,
Tehran University of Medical
Sciences

Hashtroudi AA

Imam Khomeini Hospital,
Tehran University of Medical
Sciences

Haghpanah B

Imam Khomeini Hospital,
Tehran University of Medical
Sciences

Sayyah AR

Imam Khomeini Hospital,
Tehran University of Medical
Sciences

Shakiba M

Imam Khomeini Hospital,
Tehran University of Medical
Sciences

Corresponding Author:

*Nasser Ebrahimi Daryani M.D.,
Department of Gastroenterology,*

*Imam Khomeini Hospital,
Keshavarz Blvd., Tehran, Iran.*

Tel: +98 21 88799446

Fax: +98 21 88799840

E-mail:

nebrahim@sina.tums.ac.ir

The Relationship Between Serum Alanine Aminotransferase Level and Liver Biopsy Findings in Chronic Hepatitis C

ABSTRACT

Background: Among most of the hepatic diseases, elevation of alanine amino transferase (ALT) level is the hallmark of hepatocyte necrosis. But, no study has been performed in this field in Iran.

Materials and Methods: This study is designed to compare the grade, stage, and Histological Activity Index (HAI score) of liver pathology between patients with normal serum ALT and elevated serum ALT. It has been conducted on 32 patients with normal serum ALT and 84 patients with elevated ALT level, at our clinic.

Results: The median grade and stage among patients with normal serum ALT level were 4 and 1, and among patients with elevated serum ALT they were 6.5 and 2, respectively. Stages more than 2 were detected in 5 (15.6%) and 36 (42.9%) of normal ALT and elevated ALT groups respectively ($p= 0.006$).

Conclusions: Although liver lesions are milder among most of the patients with normal serum ALT, liver biopsy is considered to be useful in chronic hepatitis C regardless of serum ALT level. *Govaresh/ Vol. 9, No. 4, Winter 2004; 232-236*

Keywords: Hepatitis C, Normal enzyme, Liver pathology